

Betakaroten i avlshoppens vinterfodring

Betakaroten er et nødvendigt næringsstof til hopper, som skal ifoles eller avlshingste i bedækningsæsonen. Men det findes ikke i tilstrækkeligt store mængder i foderet om vinteren. Om sommeren, når hestene får friskt græs, er der ingen problemer med underforsyning, idet der er rigelige mængder af Betakaroten i græsset; det forsvinder dog gradvist fra høet og wrappen om vinteren. Mange værdifulde avlshingste kommer ikke på fold og får friskt græs, derfor er det vigtigt for at opretholde en god sædproduktion, kvalitet og libido, at de får betakaroten tildelt i foderet.

Betakaroten spiller en fysiologisk vigtig rolle i hoppens og hingstens reproduktion. Stoffet indgår i hoppens "gule legemer", som udskiller hormoner, der forhindrer, at hoppen går i cyklus igen, så drægtigheden afbrydes. Hos hingsten hjælper betakaroten til med dannelsen af hormoner, der indvirker på sædproduktionen.

Det er ærgerligt, hvis man har fået sin hoppe godt bedækket, og det kort tid efter viser sig, at den alligevel ikke er i fol. Problemet, der kan skyldes mangel på betakaroten, kan modvirkes ved at give et fodertilskud af stoffet i en længere periode op til tidspunktet, hvor bedækningen skal gennemføres.

Produktfordele

Beta-Caroten-Knobrauch er en vigtig brik i reproduktionen:

- ◆ Tilskud af Beta-Caroten-Knobrauch til avlshopper er vigtigt om vinteren for at modvirke svag brunst og afbrydelse af drægtigheden
- ◆ Indholdet af betakaroten, E-vitamin, flerumættede fedtsyrer og hvidløg sikrer hoppens drægtighed
- ◆ Sædproduktion, kvalitet og libido hos avlshingsten forbedres betydeligt ved tildeling af Betakaroten.
- ◆ Tildeles betakaroten til hoppen sidst i drægtigheden øges betakarotenindholdet i hoppens råmælk og plasma, hvilket påvirker det nyfødte føls immunstatus positivt.

Fodringsanvisning

Beta-Caroten-Knoblach anvendes:

- ◆ I vintermånederne, når hestene ikke får friskt græs
- ◆ Til hopper, som skal ifoles om vinteren og i det tidlige forår, inden de kommer på græs
- ◆ Til hingsten i avlssæsonen
- ◆ **Dosering**
100 g daglig

Pakningsstørrelser

3 og 10 kg spand samt 25 kg sæk

Kontakt vores foderrådgivning for tilrettelæggelse af korrekt fodring

Claudia Heegaard

cand. agro

tlf. +45 2114 4213

ch@hippolyt.dk

Christina Kryder Pedersen

cand. agro

tlf. +45 2051 6780

ckp@hippolyt.dk

Marianne Sønderkjær

ernærings- og kostvejleder

tlf. +45 2371 4519

ms@hippolyt.dk

Jórun Sumberg-Olsen

cand. med. vet.

tlf. +45 2371 4457

joso@hippolyt.dk